

Plodina	Škodlivý činiteľ	Prípravok	Poznámky
<u>egreše</u>	<u>Múčnatka na ríbezliach a egrešoch</u>	<u>HF MYCOL</u>	druhý preventívny postrek citlivých odrôd ihneď po odkvitnutí, tretí o dva týždne neskôr
<u>jablone</u>	<u>Múčnatka jabloňová</u>	<u>KUMULUS WG</u> <u>TALENT</u> <u>THIOVIT JET</u> <u>TOPAS 100 EC</u> <u>ZATO 50 WG</u>	prvý preventívny postrek náchylných odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí; pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované listové ružice a konce výhonkov
<u>jablone</u> <u>hrušky</u>	<u>Chrastavitosť jadrovín</u>	<u>DELAN 700 WDG</u> <u>EFUZINE 500 SC</u> <u>FOLPAN 80 WDG</u> <u>SYLLIT 65 WP</u> <u>TALENT</u> <u>TERCEL</u> <u>ZATO 50 WG</u>	prvý preventívny postrek náchylných odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí stromov
<u>jablone</u>	<u>Piliarka jablčná</u>	<u>BULLDOCK 25 EC</u> <u>CALYPSO 480 SC</u> <u>MOSPILAN 20 SP</u> <u>RELDAN 22</u>	- postrek skôr kvitnúcich odrôd ihneď po odkvitnutí - uvedené prípravky sa môžu použiť aj proti nosákovi, poškodzujúcim mladé plody; na miestach ich premnoženia treba urobiť postrek 2 a 4 týždne po odkvitnutí jabloní
<u>jahody</u>	<u>Botrytída (Sivá hniloba) jahôd</u>	<u>TELDOR 500 SC</u>	postreky na začiatku kvitnutia a o 7 dní neskôr sú potrebné najmä v oblastiach s výdatnými dažďami
<u>jahody</u>	<u>Kvetovka jahodová</u>	<u>DECIS EW 50</u> <u>KARATE ZEON 5 CS</u>	- škodca nahryzáva stopky kvetných pukov jahôd vysadených najmä v blízkosti lesov - prípravky sa aplikujú krátko pred kvitnutím jahôd
<u>ovocné dreviny</u> <u>vinič</u>	<u>Chloróza ovocných drevín a viniča</u>	<u>FLORASIN LIGNOVIT Fe</u>	v oblastiach, kde bol v minulom roku zistený výskyt chlorózy, aplikujeme uvedené hnojivo vo forme zálievky do rýh vykopaných po obvode koruny stromov a ku koreňom viniča
<u>hrušky</u>	<u>Méra hrušková</u>		proti škodcovi nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky; v zahraničí proti nej používajú prípravky Sanmite 20 WP a Vertimec 018 EC; u nás je z nich dostupný Vertimec, ktorý je povolený na ošetrovanie jadrovín proti roztočom
<u>slivky</u>	<u>Piliarka slivková</u>	<u>CALYPSO 480 SC</u> <u>MOSPILAN 20 SP</u>	postrek stromov ihneď po odkvitnutí; uvedenými prípravkami zasiahneme aj proti ďalším škodcom, nachádzajúcim sa v čase postreku na stromoch (napr. vošky, nosáky, šupináčiky)
<u>vinič</u>	<u>Akarinóza na viniči</u> <u>Erinóza na viniči</u>	<u>KUMULUS WG</u> <u>THIOVIT JET</u>	postrek viniča krátko po vypučaní (ak sme tesne pred pučaním nepoužili Sulku) najmä v tých výsadbách, kde bol v minulom roku zistený výskyt akarínózy alebo erinózy